


Calcium protocol na een completerende of totale thyreoïdectomie



*Level 1 suppletie: calciumcarbonaat 2dd1000mg + alfacalcidol 1dd1.0ug.
 **Level 2 suppletie: calciumcarbonaat 2dd1000mg + alfacalcidol 1dd1.5ug.
^a PTH daling: ((preoperatief PTH - postoperatief PTH)/preoperatief PTH) x 100%.
^b Wanneer de PTH daling niet te bepalen is: absolute waarde postoperatieve PTH van <2.0 pmol/L aanhouden voor onderscheid low-risk en medium-risk.
^c Tintelingen en/of spierspasmen.
^d Volgens lokaal toedieningsprotocol.
^e Recept (Level 1) uitschrijven voor 3 dagen en uitleg inname alleen bij symptomen thuis. Vermelden dat calciumtabletten bij een willekeurige drogist goedkoper zijn en dat dit bij langdurig gebruik van calcium overwogen kan worden.
^f De aard en frequentie van follow-up zijn afhankelijk van de beoordeling van de hoofdbehandelaar.
^g Definitie persisterende hypoparathyreoïdie: het gebruik van actief vitamine D met/zonder calcium suppletie na 12 maanden waarbij er een poging is gedaan tot afbouwen suppletie.

¹Afbouwschema's

Indien ontslagen met 2dd1g calciumcarbonaat en 1dd1ug alfacalcidol:
 Eerste week: 2dd1g calciumcarbonaat en 1dd1ug alfacalcidol
 Tweede week: 2dd1g calciumcarbonaat en 1dd0.5ug alfacalcidol
 Derde week: 2dd1g calciumcarbonaat en stop alfacalcidol
 Vierde week: 1dd1g calciumcarbonaat
 Vijfde week: stop calciumcarbonaat

Indien ontslagen met 2dd1g calciumcarbonaat en 1dd1.5ug alfacalcidol:
 Eerste week: 2dd1g calciumcarbonaat en 1dd1.5ug alfacalcidol
 Tweede week: 2dd1g calciumcarbonaat en 1dd1ug alfacalcidol
 Derde week: 2dd1g calciumcarbonaat en 1dd0.5ug alfacalcidol
 Vierde week: 2dd1g calciumcarbonaat en stop alfacalcidol
 Vijfde week: 1dd1g calciumcarbonaat
 Zesde week: stop calciumcarbonaat

Indien symptomen tijdens afbouwen, terug naar hogere dosering en contact endocrinoloog.