

Controleer calcium: 6 uur postoperatief, ochtend postoperatief én bij nieuw ontstane klachten

Calcium gecorrigeerd < 1.85 mmol/L

Symptomatisch

Asymptomatisch

Calcium gecorrigeerd ≥ 1.85 mmol/L

Symptomatisch

Asymptomatisch

- 1. Calciumcarbonaat p.o. 2dd 1000mg
- 2. Alfacalcidol p.o. 1dd 1.5 mcg
- 3. Calciumgluconaat i.v. bolus 1 gram *

- 1. Calciumcarbonaat p.o. 2dd 1000mg
- 2. Alfacalcidol p.o. 1dd 0.5 mcg

Calciumcarbonaat p.o. 2dd 1000mg

Expectatief: ontslag vanaf dag 1 postoperatief

Controleer calcium iedere 6 uur: herhaal bolus of geef continu infuus tot calcium ≥ 1.85
Indien Mg < 0.45 mmol/L: geef Mg i.v. bolus 2 gram *

Controleer Ca na 6 uur

Bij aanhoudende klachten: voeg alfacalcidol 1dd 0.5 mcg toe.**
Ophogen met stapjes van 0.5 mcg tot maximaal 1.5 mcg

Ontslag (met orale medicatie) vanaf dag 1 postoperatief

Ca < 1.85 mmol/L:
1. Alfacalcidol ophogen naar 1dd 1.5 mcg
2. Calciumgluconaat i.v. bolus 1 gram *

Ca ≥ 1.85 mmol/L:
Ontslag (met orale medicatie) vanaf dag 1 postoperatief

* volgens lokaal toedieningsprotocol

** alleen bij een verlaagd serum calcium (gecorrigeerd voor albumine)

Ca < 1.85 mmol/L:
herhaal i.v. calciumgluconaat *

Ca ≥ 1.85 mmol/L:
ontslag (met orale medicatie)

Controleer Ca 12 uur na staken i.v. toediening

